

**INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA**

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

**SUTAB<sup>®</sup>**  
 (sulfato de sodio, sulfato de  
 magnesio y cloruro de potasio)  
 en comprimidos  
 1.479 g/0.225 g/0.188 g

**Esquema de administración**

SUTAB es un tratamiento de dosis fraccionada (2 días). Se requiere un total de 24 comprimidos para la preparación completa para una colonoscopia. Usted tomará los comprimidos en dos dosis de 12 comprimidos cada una. Cada dosis de SUTAB debe beberse con agua, y debe beberse más agua luego de cada dosis.

**DOSIS 1: El día anterior a la colonoscopia****Tome los comprimidos con agua**

**PASO 1** Abra un frasco de 12 comprimidos.

**PASO 2** Llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). Trague cada comprimido con un sorbo de agua y beba toda el agua durante un lapso de 15 a 20 minutos.



Los comprimidos no se muestran en el tamaño real.

**IMPORTANTE:** Si presenta síntomas relacionados con el preparado (por ejemplo, náuseas, distensión abdominal o cólicos), tome una pausa o reduzca el ritmo al que bebe el agua adicional hasta que disminuyan sus síntomas.

**Beba más agua**

**PASO 3** Aproximadamente una hora después de tomar el último comprimido, llene el recipiente proporcionado nuevamente con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

**PASO 4** Aproximadamente 30 minutos después de terminar de beber el segundo recipiente de agua, llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

**DOSIS 2: Día de la colonoscopia**

- Siga bebiendo solo líquidos transparentes hasta después de la colonoscopia.
- La mañana de la colonoscopia (5 a 8 horas antes de la colonoscopia y no antes de cuatro horas después de iniciar la dosis 1), abra el segundo frasco de 12 comprimidos.
- Repita el PASO 1 al PASO 4 de la dosis 1.



Los comprimidos no se muestran en el tamaño real.

**IMPORTANTE:** Debe terminar de tomar todos los comprimidos de SUTAB y el agua requerida al menos **6** horas antes de la colonoscopia.

(Consulte la otra página para obtener más instrucciones).

